

Checkliste Reiseimpfungen

Schutzimpfungen – die wichtigsten im Überblick

HanseMerkur



Versicherungsgruppe

Krankheit	Übertragung	Hauptvorkommen	Impfung
Cholera <i>bakterielle Durchfallerkrankung</i>	<ul style="list-style-type: none"> durch Trinken von bakteriell infiziertem Wasser durch Verzehr von bakteriell infizierten Lebensmitteln 	Nord- und Zentralafrika, Südamerika, Südostasien	<ul style="list-style-type: none"> 2 Schluckimpfungen im Abstand von 1 bis 6 Wochen Impfschutz 8 Tage nach Impfung für ca. 2 Jahre
Diphtherie <i>bakterielle Infektion der Atemwege</i>	<ul style="list-style-type: none"> durch Tröpfcheninfektion 	Weltweit	<ul style="list-style-type: none"> 2 Impfungen im Abstand von 4 bis 8 Wochen, 3. Impfung nach ca. 1 Jahr Auffrischung alle 10 Jahre
Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) <i>virale Entzündung des Gehirns oder der Hirnhäute</i>	<ul style="list-style-type: none"> durch Zeckenbisse 	Europa	<ul style="list-style-type: none"> 2 Impfungen im Abstand von 1 bis 3 Monaten und eine 3. Impfung nach 9 bis 12 Monaten Impfschutz beginnt 14 Tage nach der 2. Impfung Langzeitschutz für 3 bis 5 Jahre bei Auffrischimpfung nach 1 Jahr
Gelbfieber <i>schwere Viruserkrankung</i>	<ul style="list-style-type: none"> durch Stechmücken 	Tropische Regionen Afrikas, Südamerika	<ul style="list-style-type: none"> nur in staatlich zugelassenen Gelbfieber-Impfstellen 1 Impfung Impfschutz nach 10 Tagen für 10 Jahre
Hepatitis A <i>Leberentzündung verursacht durch Hepatitis A-Virus</i>	<ul style="list-style-type: none"> durch den Verzehr von infizierten Lebensmitteln durch Schmierinfektionen 	Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika, Osteuropa, einige Mittelmeerländer	<ul style="list-style-type: none"> 2 Impfungen im Abstand von 6 bis 12 Monaten Impfschutz 2 Wochen nach erster Injektion und hält nach der 2. Impfung 5 bis 10 Jahre
Hepatitis B <i>Leberentzündung verursacht durch Hepatitis B-Virus</i>	<ul style="list-style-type: none"> durch Verletzungen durch Körperflüssigkeiten (Speichel, Sperma) 	Weltweit	<ul style="list-style-type: none"> 2 Impfungen im Abstand von 4 Wochen und eine 3. Impfung 6 Monate nach der 1. Impfung Impfschutz nach letzter Injektion für ca. 10 Jahre



Checkliste Reiseimpfungen

Schutzimpfungen – die wichtigsten im Überblick

HanseMerkur



Versicherungsgruppe

Krankheit	Übertragung	Hauptvorkommen	Impfung
Japanische Enzephalitis <i>virale Gehirnentzündung</i>	<ul style="list-style-type: none"> durch Stechmücken 	Ferner Osten, Süd-Ost-Asien, während der Regenzeit	<ul style="list-style-type: none"> 2 Impfungen im Abstand von 1 Woche und eine 3. Impfung nach 1 bis 3 Wochen Impfschutz nach der 3. Injektion und hält ca. 4 Jahre
Meningokokken-Meningitis <i>bakterielle Hirnhautentzündung</i>	<ul style="list-style-type: none"> durch Tröpfcheninfektion 	Afrika, Südamerika, Asien	<ul style="list-style-type: none"> einmalige Injektion Impfschutz nach 2 bis 3 Wochen Impfschutz 3 Jahre
Polio (Kinderlähmung) <i>virale Infektionskrankheit</i>	<ul style="list-style-type: none"> durch Tröpfcheninfektion durch Schmierinfektion 	Weltweit	<ul style="list-style-type: none"> 2 Grundimpfungen (i.d.R. im Kindesalter) Auffrischung alle 10 Jahre
Tetanus (Wundstarrkrampf) <i>bakterielle Infektionskrankheit</i>	<ul style="list-style-type: none"> durch Infektion schon bei kleinsten Verletzungen 	Weltweit	<ul style="list-style-type: none"> 3 Grundimpfungen im Kindesalter Auffrischung alle 10 Jahre
Tollwut <i>virale Infektionskrankheit</i>	<ul style="list-style-type: none"> durch Bisse infizierter Tiere 	Weltweit	<ul style="list-style-type: none"> 2 Impfungen im Abstand von 1 Woche und eine 3. Impfung 2 Wochen später Impfschutz 2 Wochen nach der letzten Injektion und hält ca. 2 bis 5 Jahre
Typhus <i>bakterielle Infektionskrankheit</i>	<ul style="list-style-type: none"> durch den Verzehr von infizierten Lebensmitteln durch Schmierinfektionen 	alle Länder mit unzureichendem Hygienestandard	<ul style="list-style-type: none"> 3 Schluckimpfungen jeweils im Abstand von 2 Tagen Impfschutz 10 Tage nach der letzten Einnahme <p>Oder</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Spritzimpfung Impfschutz nach 7 bis 14 Tagen für ca. 3 Jahre

